

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

# VETERINÁRNÍ VADEMECUM pro farmaceuty

**Lubomír Ducháček, Jiří Lamka**

**KAROLINUM**

**Veterinární vademecum  
pro farmaceuty**

**MVDr. Lubomír Ducháček, Ph.D.  
prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.**

---

Recenze:

prof. MVDr. Jan Šimůnek, DrSc.

MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc.

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum  
pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

Sazba DTP Nakladatelství Karolinum

Vydání druhé, nezměněné

© Univerzita Karlova v Praze, 2014

© Jiří Lamka, Lubomír Ducháček, 2014

Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou nakladatelství

ISBN 978-80-246-2792-2

ISBN 978-80-246-2821-9 (online : pdf)



Univerzita Karlova v Praze  
Nakladatelství Karolinum 2014

<http://www.cupress.cuni.cz>

# OBSAH

<b>ÚVOD</b> .....	5
<b>SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU</b> .....	7
<b>1. ANTIPARAZITIKA A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARAZITÓZY PSŮ, KOČEK, KRÁLÍKŮ A DRŮBEŽE</b> .....	9
1.1 Zevní antiparazitika (antiektoparazitika, ektoparazitika) .....	9
1.2 Anthelmintika .....	18
1.3 Antiprotozoika .....	28
1.4 Lékové formy antiparazitik a způsoby jejich podání u psů a koček .....	32
1.5 Nejvýznamnější ektoparazitózy psů a koček .....	38
1.6 Nejvýznamnější endoparazitózy psů a koček .....	50
1.7 Kokcidióza králíků .....	61
1.8 Kokcidióza drůbeže .....	64
<b>2. VITAMINY A MINERÁLNÍ LÉČIVA</b> .....	67
2.1 Vitaminy rozpustné v tucích .....	68
2.2 Vitaminy rozpustné ve vodě .....	70
2.3 Makroprvky .....	71
2.4 Mikroprvky .....	73
2.5 Některá onemocnění související s nedostatkem nebo nadbytkem vitaminů a minerálních látek .....	75
<b>3. OTOLOGIKA</b> .....	81
3.1 Zánět zevního zvukovodu .....	81
3.2 Nemoci paranálních váčků .....	87
<b>4. GYNEKOLOGIKA A HORMONY</b> .....	89
4.1 Zánět mléčné žlázy (mastitis) .....	89
4.2 Zánět sliznice děložní (endometritis) .....	98
4.3 Hormonální ovlivnění pohlavního cyklu fen a koček .....	104
4.4 Zamezení nebo přerušení nežádoucí březosti fen a koček .....	107

<b>5. ANTITYMPANIKA, STOMACHIKA A RUMINATORIA</b> .....	111
5.1 Akutní nadmutí přežvýkavců (tympanie, meteorismus) .....	112
5.2 Acidóza bachoru.....	113
5.3 Alkalóza bachoru.....	114
5.4 Hniloba bachoru.....	115
<b>6. BIOLOGICKÉ ÚDAJE VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT</b> .....	118
<b>REJSTRÍK</b> .....	121
<b>POUŽITÁ LITERATURA</b> .....	125

# ÚVOD

V tomto odborném materiálu určeném pro posluchače studijního programu farmacie ale i dalším zájemcům o problematiku veterinárních léčiv z řad farmaceutů se zabýváme nejvýznamnějšími veterinárii z pohledu lékařské praxe. Zevrubně popisujeme v lékárnách nejčastěji zastoupené farmakologické a indikační skupiny, současně podáváme stručnou charakteristiku základních nosologických jednotek, které s těmito skupinami souvisí.

Z našich poznatků i ze závěrů diplomové práce Mgr. Martiny Popelkové vyplývá, že veterinární léčiva v tuzemských lékárnách zpravidla představují jen minoritní podíl sortimentu léčiv, jsou však jeho důležitou a pravidelnou součástí. Ukazuje se, že velká většina lékáren má k dispozici alespoň omezený sortiment veterinární, přibližně tři čtvrtiny připadají na veterinární léčivé přípravky a biopreparáty, zbývající podíl představují ostatní veterinária. Veterinárními přípravky jsou přitom zásobováni především zájmoví chovatelé daného regionu.

V největší míře se jedná o léčivé přípravky ze skupiny antiparazitik, vitaminů a minerálů, v menší míře jsou pak zastoupena otologika, gynekologika, stomachika, ruminatoria a antitympanika. Zastoupení ostatních skupin je spíše okrajovou záležitostí. Veterinária jsou k dispozici především v lékových formách, které umožňují chovatelům snadnou aplikaci, jako jsou tablety, prášky a roztoky. Součástí sortimentu veterinárií v lékárnách jsou i mnohé další přípravky, které nemají charakter léčivých přípravků. Také v případě těchto veterinárií jde často o přípravky s antiparazitárními účinky, ve snadno aplikovatelných lékových formách. My jsme se však zabývali v předloženém materiálu především problematikou registrovaných veterinárních léčivých přípravků.

Přestože počet veterinárních léčivých přípravků registrovaných ÚSKV-BL v posledních letech klesá a přípravky ze skupiny ostatních veterinárií lze ve stále větší míře získat i mimo síť lékáren, sortiment veterinárií

v českých lékárnách zůstává pro potřeby praxe dostatečně široký a jejich přítomnost je stále důležitá. Především zájmoví chovatelé se spoléhají na možnost opatřit si veterinární přípravky ve své lékárně. Obdobný vývoj lze pravděpodobně očekávat i v blízké budoucnosti.

Rádi bychom touto cestou poděkovali recenzentům prof. MVDr. Janu Šimůnkovi, DrSc., a MVDr. PharmDr. Radmile Zavadilové, CSc., za odborné zhodnocení textu práce, jejich cenné připomínky a podněty.

Autoři

# SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU

AChE	acetylcholinesteráza
ATP	adenosintrifosfát
CTC	chlortetracyklin
CNS	centrální nervová soustava
DC	dry cow (kráva stojící na sucho)
DH-streptomycin	dihydrostreptomycin
DMSO	dimetylsulfoxid
G+	pozitivní barvitelnost bakterií podle Grama
G-	negativní barvitelnost bakterií podle Grama
GABA	$\gamma$ -aminomáselná kyselina
GIT	gastrointestinální trakt
gtt.	kapky
gtt. oto.	ušní kapky
GnRH	gonadotropiny uvolňující hormon
HVLP	hromadně vyráběné léčivé přípravky
IACHÉ	inhibitory acetylcholinesterázy
IGR	růstové regulátory hmyzu
i. m.	intramuskulární aplikace
inj.	injekce
intramam. susp.	intramamární suspenze
intramam. ung.	intramamární mast
LC	lactating cow (laktující kráva)
lot.	locio
LH	luteinizační hormon
MMA syndrom	syndrom mastitis, metritis, agalaktie
NK-test	Neumannův-Kudělkův test
OL	ochranná lhůta
OTC	oxytetracyklin

plv.	prášek
plv. sol.	vodorozpustný prášek
pst.	pasta (perorální)
p.o.	perorální aplikace
s.c.	subkutánní aplikace
sol.	solutio
spp.	species (druhy)
STM	streptomycin
susp.	suspenze
susp. oto.	suspenze ušních kapek
susp. uter.	děložní suspenze
tbl.	tablety
tbl. uter.	děložní tablety
TC	tetracyklin
TMK	těkavé mastné kyseliny
ung.	mast
ÚSKVBL	Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv



# 1. ANTIPARAZITIKA A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARAZITÓZY PSŮ, KOČEK, KRÁLÍKŮ A DRŮBEŽE

## 1.1 Zevní antiparazitika (antiektoparazitika, ektoparazitika)

Přípravky proti zevním parazitům lze rozdělovat podle několika kritérií, nejdůležitějším hlediskem je obsah účinné látky. Účinnostní charakteristiky se liší jak v rychlosti, způsobu a délce účinku, tak i v bezpečnosti a snášenlivosti ošetřovanými zvířaty. Některé přípravky obsahují kombinaci léčiv různého mechanismu působení. Z praktického hlediska je významné i rozdělení přípravků podle lékové formy a způsobu podání. Většina přípravků existuje v jedné aplikační formě, ale někteří výrobci jich nabízejí u téže účinné látky několik.

Podle obsahu účinné látky můžeme antiiektoparazitika psů a koček rozdělit na karbamáty (karbaril, propoxur), pyretriny (pyretrin) a pyretroidy (permetrin, tetrametrin, cypermetrin, flumetrin, deltametrin), makrocyclické laktony (selamektin, moxidektin), růstové regulátory hmyzu (lufenuron, metopren, pyriproxyfen, fenoxycarb) a léčiva ostatních chemických struktur amitraz, fipronil, imidakloprid, popř. benzylbenzoát, sulfiram a tiabendazol.

### 1.1.1 Karbamáty

Mechanismus antiiektoparazitárního účinku karbamátů je založen na reverzibilní inhibici AChE ektoparazitů. Afinita karbamátů k cílovému enzymu je v porovnání se stejně působícími organofosfáty (nejsou již pro použití u psů a koček registrovány) nižší a jejich účinek je slabší. Snášenlivost karbamátů zvířaty je však lepší. Současné podání léčiv s obdobným účinkem je kontraindikováno. Léčba při akutní intoxikaci je obdobná jako u otravy organofosfáty, tj. podání atropinu, nepodáváme však reaktivátory cholinesterázy (oximy). K registrovaným karbamátům patří již pouze

**karbaril**, jenž je obsažen v kombinovaném otologickém přípravku. Součástí schválených antiektoparazitárních přípravků je **propoxur**.

### 1.1.2 Pyretroidy

Pyretroidy jsou synteticky připravená analoga přirozených pyretrinů (**pyretrin**). Výhodou syntetických pyretroidů oproti klasickým pyretrinům je vyšší a rychlejší účinek, větší stabilita (pyretriny jsou rychle rozkládány působením světla), lepší reziduální efekt, nižší pořizovací cena a zvýšená bezpečnost pro hostitele, i když nejsou tak neškodné co se toxicity týče, jak se dříve uvádělo (zvláště při použití koncentrovaných forem léčiva u koček ale i malých plemen psů). Pyretroidy působí proti ektoparazitům kontaktně adulticidně. Mechanismus účinku je založen na ovlivnění iontových kanálů nervových vláken parazitů (mají silný paralytický účinek na jejich nervovou soustavu). Z léčiv této skupiny je využíván **permetrin, tetrametrin, cypermetrin, flumetrin a deltametrin**. Koncentrované roztoky určené k lokální aplikaci (spot-on) jsou kontraindikovány u koček všech věkových kategorií a štěňat do dvou měsíců věku. Permetrin je jedním z mála antiektoparazitik, který má i repelentní vlastnosti.

Pyretroidy mohou být kombinovány se synergicky působícími látkami jako je **piperonyl** (snižuje fotosenzibilitu pyretroidů), nebo i s jinými antiektoparazitiky (imidaklopid, IGR).

### 1.1.3 Makrocyclické laktony

Avermektiny a milbemyciny jsou léčiva biosyntetického původu s antinematodní a antiektoparazitární účinností (endektocid), nepůsobí na trematoda a cestoda. Původní mechanismus účinku, tj. ovlivnění GABA neurotransmise na nervových vláčknech parazitů, byl novějšími studiemi opraven v tom smyslu, že nejvýznamnější roli na receptorech ovládajících chloridové kanály hraje glutamát. Funkčnost tohoto neurotransmiteru makrocyclické laktony žádoucím směrem pozměňují, GABA hraje pouze podružnou roli.

Pro savce jsou relativně neškodné, protože hematoencefalická bariéra brání přestupu makrocyclických laktonů z krve do mozku. Makrocyclické laktony působí systémově, vylučují se ve značném množství ve feces převážně v nezměněné formě. Jsou obsaženy též v mléce. V zevním prostředí jsou degradovány jen velice pomalu. S ohledem na mechanismus působení

nejsou na obecné úrovni pro makroorganismus toxické. Při použití u psů je třeba vzít v úvahu zvláště vysokou citlivost u kolíí, šeltíí, bobtailů, briardů, jezevčků popř. jiných plemen psů, laktony u těchto plemen psů prostupují hematoencefalickou bariérou. Důvodem je geneticky změněná funkčnost p-glykoproteinových přenašečů v hematoencefalické bariéře. Léčivo tak zvyšuje nitrolební tlak, působí neurotoxicky až s následkem exitu.

Ze skupiny makrocyclických laktonů jsou pro použití u psů a koček registrovány pouze **selamektin** a **moxidektin** podávané v malém aplikačním objemu na kůži v oblasti krku (spot-on). Subkutánní aplikace ivermektinu či jiných laktonů je v současné době vzhledem k možnosti vzniku intoxikace s fatálním koncem zbytečným rizikem pro pacienta i jeho veterinárního lékaře.

### 1.1.4 Růstové regulátory hmyzu (IGR – insect growth regulators)

Představují nově zaváženou skupinu léčiv, která nemá přímý insekticidní (adulticidní) účinek. Jejich účinek spočívá v zajištění ztráty životaschopnosti bleších vajíček a v ovlivnění metamorfózy larvy, čímž potlačují vývoj imaga a tak narušují biologický cyklus hmyzu.

Představitelem růstových regulátorů inhibujících syntézu chitinu (chitin synthesis inhibitors) je **lufenuron** (chemicky se jedná o derivát benzoylfenol močoviny), jehož mechanismus účinku spočívá v blokadě tvorby chitinu, který je nezbytný pro vývoj všech vývojových stádií blech. Zvířatům je podáván perorálně, působí systémově, ukládá se v tukové tkáni zvířat, odtud se postupně uvolňuje do krve. Po nasátí se blech krví lufenuron proniká do jejich vajíček a činí je neschopnými dalšího vývoje. Současně je vylučován trusem blech (potrava larev), dochází tak i k zastavení vývoje blech. Je však třeba léčit všechny psy a kočky v domácnosti současně. Po několika měsících lze docílit likvidace blech nejen na pacientovi, ale i v prostředí (asanace prostředí). Regulátory růstu jsou netoxické pro teplokrevné živočichy, dospělé blechy také neovlivňují přímo. Pozitivní účinek léčiva se objeví zprostředkovaně přes vývojová stadia, dospělé blechy v té době přetrvávají na hostiteli. Samotné bez současného použití účinných adulticidů tedy nejsou vhodné pro zvířata přecitlivělá na bleší kousnutí. Léčivo je součástí monokompozitního přípravku.

Do skupiny růstových regulátorů hmyzu, které účinkují jako juvenilní hormony bránící vývoji vajíček a larev, patří metopren, pyriproxifen a fenoxycarb.

**Metopren** je analogem přirozeného juvenilního hormonu blech netininu. Procesy řízené tímto hormonem zahrnují metamorfózu a svlékání larválních stádií blech. Ovocidní aktivita metoprenu se uskutečňuje jednak přímou penetrací přes obal nově nakladených vajíček a též resorpcí přes kutikulu dospělých blech. Metopren je rovněž vysoce účinný při zábraně vývoje bleších larev a kukel. Vystavení vajíček nebo larev působení metoprenu zapříčiňuje jejich abnormální vývoj vedoucí k jejich úhynu. Utváření kukel a líhnutí nových jedinců je tak zastaveno. Podobně jako jiné růstové regulátory není účinný proti dospělcům. Vzhledem k tomu, že savci nemají juvenilní hormony, metopren není toxický pro domestikovaná zvířata nebo člověka. Navíc je vysoce specifický pro blechy a proto netoxický pro jiné druhy hmyzu. Léčivo je využíváno jako součást kombinovaného přípravku s adulticidně působícím fipronilem.

**Pyriproxifen** má stejný účinek jako metopren. Blechy jej mohou absorbovat přímým kontaktem stejně jako sáním krve. Vajíčka produkováná dospělými blechami jsou neplodná a juvenilní hormony bránící zakuklení současně způsobí, že larva roste dál, vytváří obří, nebo malformovanou zakuklenou larvu, která hyne. Pyriproxifen je kombinován s adulticidně působícím permetrinem.

Také **fenoxycarb** inhibuje vývoj vajíček i larev a nepůsobí na dospělé. Je bezpečný a nemá vedlejší účinky. V porovnání s metoprenem méně podléhá fotochemické degradaci a jeho působení je tak delší. Léčivo je kombinováno s adulticidně působícím permetrinem.

### 1.1.5 Léčiva ostatních chemických struktur

**Amitraz** je nejvýznamnějším léčivem skupiny formamidinů (diamidiny) nalézající uplatnění především při léčbě demodikózy a svrabu (akaricid – k hubení roztočů). Není indikován při léčbě zablešení (jeho účinnost na blechy je minimální). Mechanismus účinku je založen na ovlivnění oktopaminových receptorů nervových vláken parazitů. Amitraz je významnou alternativou při vzniku rezistence parazitů k působení karbamátů nebo pyretroidů. Léčivo je kontraindikováno u plemene čivava, nesmí být aplikováno kočkám. Sloučenina je toxická pro ryby.

**Fipronil** (fenylpyrazoly) představuje jednu z posledních generací antiektoparazitik označovaných jako kontaktní adulticidy. Mechanismus účinku spočívá v blokádě GABA receptorů nervových buněk parazitů

(GABA je hlavním neurotransmitrem u blech a klíšťat). Důsledkem toho dochází k nekoordinované činnosti CNS a jejich úhynu. Fipronil usmrcuje blechy během 24 hodin (skutečnost, že se blechy nemusí nasát krve, aby byly zabity je velkou výhodou zejména u zvířat alergických na bleší kousnutí) a klíšťata v průběhu 48 hodin po zasažení. Dlouhodobý účinek fipronilu u savců je dán jeho afinitou a stabilní vazbou na lipidové substance tělního pokryvu. Po aplikaci na kůži proniká do chlupových váčků a mazových žlázek kožní škáry, kde se hromadí a odkud je povolna uvolňován zpět, čímž je umožněna jeho dlouhodobá účinnost. Kromě toho je velmi těžce rozpustný ve vodě, takže dochází jen k minimálním ztrátám léčiva při koupání či zmoknutí zvířete, což taktéž přispívá k zajištění dlouhodobé ochrany proti ektoparazitům. GABA receptory nervových buněk parazitů jsou k fipronilu podstatně citlivější než tytéž cílové struktury u savců. To činí aplikaci fipronilu velmi bezpečnou a umožňuje jeho použití u mladých a březích zvířat. Riziko možné otravy je velmi nízké, avšak u některých druhů malých savců se jeho použití nedoporučuje (např. králík). Léčivo je využíváno monokompozitně, nebo kombinaci s IGR.

**Imidaklopid** (chloronikotinyly, neonikotinoidy) ovlivňuje nikotinové receptory nervových vláken ektoparazitů, pro zvířata a člověka je prakticky neškodný. Imidaklopid má kontaktní adulticidní účinek (po kontaktu zabíjí blechy téměř ihned aniž by se musely nasát krve hostitele). Imidaklopid usmrcuje více než 90 % blech do 12 hodin po aplikaci (léčivo je zvláště vhodné pro ošetření zvířat přecitlivělých na bleší kousnutí). Kromě rychlého adulticidního účinku má do značné míry i reziduální účinek daný tím, že účinná látka je lokalizována v lipidové vrstvě povrchu kůže. Transdermálně však neproniká do organismu zvířete, rozptyluje se v oblasti chlupových kořínků a může být smyt. Po koupeli nebo plavání zvířete musí být znovu aplikován, neboť dochází ke snížení jeho účinnosti. Vzhledem k tomu, že imidaklopid neproniká do systému, je jeho aplikace poměrně bezpečná. Je kombinován s endektocidem moxidektinem.

**Benzylbenzoát** je bezbarvá olejová kapalina éterové vůně, která je účinným antiectoparazitikem zejména proti svrabu a demodikóze. Benzylbenzoát se využívá jako antiectoparazitální součást kombinovaných otologických přípravků stejně jako **sulfiram** (organický derivát síry). Akaricidní účinek má i benzimidazol **tiabendazol**, který je taktéž součástí kombinovaného otologického přípravku.

Tabulka 1: Přehled antiectoparazitárních léčivých přípravků určených k léčbě ektoparazitóz psů a koček (včetně endektocidů)

Název přípravku a léková forma	Účinná látka	Indikace parazit(é)	Indikace hostitel(é)	Poznámka
<b>ADVANTAGE PRO PSY spot-on</b>	imidakloprid	ektoparazitózy (zejména blechy)	pes	nepoužívat u psů do 10 měsíců věku
<b>ADVANTAGE PRO KOČKY spot-on</b>	imidakloprid	ektoparazitózy (zejména blechy)	kočka	nepoužívat u koťat do 6 měsíců věku
<b>ADVANTIX PRO PSY spot-on</b>	imidakloprid permetrin	blechy, klíšťata, aj. ektoparazitózy	pes	nepoužívat u štěňat do 7 týdnů věku, nepoužívat u koček!
<b>ADVOCATE PRO PSY spot-on</b>	imidakloprid moxidectin	blechy, hlístice	pes	nepoužívat u štěňat mladších 7 týdnů
<b>ADVOCATE PRO KOČKY spot-on</b>	imidakloprid moxidectin	blechy, hlístice	kočka	nepoužívat u koťat mladších 9 týdnů
<b>BOB MARTIN PERMETHRIN DOG spot-on</b>	permetrin	blechy, klíšťata	pes	nepoužívat u štěňat do 2 týdnů stáří, nepoužívat u koček!
<b>DUOWIN CONTACT SPOT-ON sol.</b>	permetrin pyriproxyfen	blechy, klíšťata	pes	nepoužívat u štěňat mladších 2 měsíců a laktujících fen, nepoužívat u koček!
<b>ECTODEX sol. (laváž)</b>	amitraz	demodikóza, svrab, klíšťata, vši	pes	nepoužívat u plemene čivava u psů postižených úpalem, nepoužívat u koček!
<b>EXSPOT sol. (spot-on)</b>	permetrin	blechy, klíšťata	pes	nepoužívat u štěňat mladších 2 týdnů, nepoužívat u koček!
<b>FRONTLINE SPOT-ON DOGS sol.</b>	fipronil	blechy, klíšťata	pes	nepoužívat u štěňat do 8 týdnů stáří
<b>FRONTLINE SPOT-ON CATS sol.</b>	fipronil	blechy, klíšťata	kočka	nepoužívat u koťat do 8 týdnů stáří
<b>FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOGS sol.</b>	fipronil metopren	blechy, klíšťata, všenky, svrab	pes	bez kontraindikací

Tabulka 1: **Dokončení**

Název přípravku a léková forma	Účinná látka	Indikace parazit(é)	Indikace hostitel(é)	Poznámka
<b>FRONTLINE COMBO SPOT-ON SPOTS sol.</b>	fipronil metopren	blechy, klíšťata, všeny	kočka	bez kontraindikací
<b>NEOSTOMOSAN sol.</b> (postřik, koupel)	tetrametrin cypermetrin piperonyl	blechy, klíšťata, vši, svrab, demodikóza	pes	přípravek slouží i k asanaci prostředí zvířat, toxický pro ryby a včely
<b>PETOSAN SPOT-ON sol.</b>	permetrin fenoxycarb	blechy, klíšťata aj. ektoparazité	pes	nepoužívat u štěňat mladších 7 týdnů, nepoužívat u koček!
<b>STRONGHOLD spot-on roztok</b>	selamektin	blechy, všeny, svrab, hlístice	pes, kočka	nepoužívat u zvířat mladších 6 týdnů
<b>TOP SPOT ON STRONGER sol.</b>	permetrin	blechy, klíšťata	pes	nepoužívat u štěňat mladších 3 týdnů, nepoužívat u koček!

Tabulka 2: **Přehled schválených antiectoparazitárních přípravků určených k léčbě ektoparazitóz psů a koček**

Název přípravku a léková forma	Účinná látka	Indikace parazit(é)	Indikace hostitel(é)	Poznámka
<b>ANTIPARASITIC CANIS SHAMPOO</b>	permetrin piperonyl	blechy, vši, klíšťata	pes	při masivním napadení parazity aplikaci druhý den opakovat
<b>ARPALIT NEO PĚNA</b>	permetrin fenoxycarb	blechy, vši, všeny, klíšťata	pes, kočka aj.	ošetření zvířete je možné po 1 týdnu opakovat
<b>ARPALIT NEO SPRAY*</b>	permetrin fenoxycarb	blechy, vši, všeny, klíšťata	pes, kočka aj.	ošetření zvířete je možné po 1 týdnu opakovat
<b>ARPALIT NEO SPRAY MR*</b>	permetrin fenoxycarb	blechy, vši, všeny, klíšťata	pes, kočka aj.	ošetření zvířete je možné po 1 týdnu opakovat
<b>BIOCID – 0,4% vodní emulze*</b>	permetrin	blechy, vši, klíšťata aj.	pes aj.	nepodávat gravidním fenám, štěňatům aj. mláďatům, pro ryby, hady, ještěrky a včely je přípravek toxický

Tabulka 2: Pokračování 1

Název přípravku a léková forma	Účinná látka	Indikace parazit(é)	Indikace hostitel(é)	Poznámka
<b>BIO – GROOM FLEA &amp; TICK SHAMPOO</b>	pyretrin piperonyl	blechy, vši, klíšťata	pes, kočka	aplikaci je možné v případě potřeby zopakovat
<b>BIO KILL spray*</b>	permetrin	blechy, vši, klíšťata, roztoči	pes aj.	ošetření zvířete je možné za 1–2 týdny opakovat, pro ryby, hady, ještěrky a včely je přípravek toxický
<b>BOLFO OBOJEK PRO KOČKY A MALÉ PSY</b>	propoxur	blechy, vši, všenky, klíšťata	kočka, malí psi	před klíšťaty chrání až 10 týdnů před blechami kočky až 4 měsíce psy až 5 měsíců
<b>BOLFO OBOJEK PRO VELKÉ PSY</b>	propoxur	blechy, vši, všenky, klíšťata	velcí psi	před klíšťaty chrání až 10 týdnů před blechami až 5 měsíců
<b>BOLFO SPRAY*</b>	propoxur	blechy, vši, všenky, klíšťata	pes, kočka	aplikaci opakujeme 1–2x týdně po dobu několika týdnů
<b>BOLFO ŠAMPON</b>	propoxur	blechy, vši, všenky, klíšťata	pes, kočka	aplikace je vhodná zvláště před použitím jiných přípravků řady Bolfo
<b>BOLFO ZÁSYP</b>	propoxur	blechy, vši, všenky, klíšťata	pes, kočka	aplikaci opakujeme 1–2x týdně po dobu několika týdnů
<b>DEFENDOG sol.</b> (mechanický rozprašovač)	permetrin	blechy, klíšťata	pes	nepoužívat u štěňat do 3 měsíců, před klíšťaty chrání 30 dní před blechami 60 dní
<b>DETA WERRA NEILY – ANTI insekticid v rozprašovači*</b>	deltametrin	blechy, klíšťata, roztoči aj.	pes, kočka aj.	–
<b>DETA WERRA šampon pro psy antiparazitární</b>	permetrin	bodavý hmyz a klíšťata	pes	–
<b>DIFFUSIL V spray</b>	permetrin	blechy, vši, všenky, klíšťata, roztoči	pes, kočka	nepoužívat u březích fen a štěňat do 10 měsíců, další aplikaci provádět až za 7 dní



Tabulka 2: Pokračování 2

Název přípravku a léková forma	Účinná látka	Indikace parazit(é)	Indikace hostitel(é)	Poznámka
<b>DIFFUSIL V MR*</b> (mechanický rozprašovač)	permetrin	blechy, vši, všenky, klíšťata, roztoči	pes, kočka	nepoužívat u březích fen a štěňat do 10 měsíců další aplikaci provádět až za 7 dní
<b>DIRECT</b> (obojek)	cypermetrin	neupřesněno	pes, kočka	–
<b>DUOWIN spray</b>	permetrin pyriproxyfen	blechy, klíšťata	pes	doba účinnosti proti blechám 44 dnů, klíšťatům 30 dnů
<b>FRONTLINE spray</b>	fipronnil	blechy, všenky, klíšťata	pes, kočka	nedoporučuje se koupání zvířat 48 hodin před a po aplikaci přípravku
<b>KAWU PROTECT ANTIPARAZITÁRNÍ PUDR</b>	pyretrin piperonyl	blechy, klíšťata	pes, kočka	aplikaci je možné v případě potřeby opakovat po 14 dnech
<b>KAWU PROTECT ANTIPARAZITÁRNÍ SPRAY</b>	pyretrin piperonyl	blechy, klíšťata	pes, kočka	aplikaci je možné v případě potřeby opakovat po 14 dnech
<b>KAWU PROTECT ANTIPARAZITÁRNÍ ŠAMPON</b>	pyretrin piperonyl	blechy, klíšťata	pes, kočka	aplikaci je možné v případě potřeby opakovat po 2–4 týdnech
<b>KILTIX OBOJEK PRO MALÉ PSY</b>	propoxur flumetrin	blechy, klíšťata	pes	–
<b>KILTIX OBOJEK PRO STŘEDNÍ PSY</b>	propoxur flumetrin	blechy, klíšťata	pes	–
<b>KILTIX OBOJEK PRO VELKÉ PSY</b>	propoxur flumetrin	blechy, klíšťata	pes	–
<b>ORTHOSAN V</b> (antiparazitární šampon)	permetrin	blechy, vši, klíšťata, roztoči	pes, kočka	nepoužívat u březích fen a štěňat do 10 měsíců, další aplikaci provádět až za 7 dní, přípravek je toxický pro ryby
<b>PETOSAN SPRAY*</b>	permetrin piperonyl fenoxycarb	blechy, vši, všenky, klíšťata	pes, kočka	aplikovat od stáří 7 týdnů u psů a 8 týdnů u koček

Tabulka 2: Dokončení

Název přípravku a léková forma	Účinná látka	Indikace parazit(é)	Indikace hostitel(é)	Poznámka
<b>PREVENTIC obojek pro psy</b>	amitraz	klíšťata, <i>Demodex canis</i>	pes	používat od 8 týdnů věku, ochrana proti klíšťatům po dobu až 4 měsíců, účinek na <i>Demodex canis</i> 1 měsíc
<b>RIVAL antiparazitární šampon pro psy</b>	cypermetrin	blechy, vši, klíšťata	pes	minimální účinnost 4 týdny
<b>RIVAL antiparazitární šampon pro kočky</b>	cypermetrin	blechy, vši, klíšťata	kočka	minimální účinnost 4 týdny
<b>RIVAL DUO antiparazitární šampon s kondicionérem</b>	cypermetrin	blechy, vši, klíšťata	pes (dlouhosrstá plemena)	minimální účinnost 4 týdny
<b>RIVAL SPREJ*</b>	cypermetrin	blechy, klíšťata	pes, kočka aj.	minimální účinnost 4 týdny
<b>SCALIBOR PROTECTORBAND antparazitární obojek pro malé a střední psy</b>	deltametrin	blechy, klíšťata, pakomáři ( <i>Phlebotomus</i> )	pes	ochrana proti blechám po dobu 4 měsíců, ochrana proti klíšťatům po dobu 6 měsíců
<b>SCALIBOR PROTECTORBAND antparazitární obojek pro velké psy</b>	deltametrin	blechy, klíšťata, pakomáři ( <i>Phlebotomus</i> )	pes	ochrana proti blechám po dobu 4 měsíců, ochrana proti klíšťatům po dobu 6 měsíců

\* přípravek slouží i k asanaci prostředí zvířat

## 1.2 Anthelmintika

Z anthelmintik psů a koček mají v našich podmínkách praktický význam pouze antinematoda (*Nematoda* – hlístice) a anticestoda (*Cestoda* – tasemnice). Trematodózy (onemocnění vyvolaná motolicemi) se u masožravců vyskytují pouze sporadicky. Některá anthelmintika jsou účinná proti oběma zmíněným třídám červů nebo i proti původcům zevních para-

zitóz (endektocida). Antiparazitární léčivé přípravky jsou pak často založeny na kombinaci anthelmintik různého mechanismu účinku i odlišného spektra účinku (včetně endektocidů).

Mezi nejvýznamnější anthelmintika využívaná u psů a koček patří benzimidazoly (fenbendazol, flubendazol, mebendazol, oxibendazol a febantel), makrocyclické laktony (selamektin, moxidektin, a milbemyctinoxim), imidazothiazoly (levamizol), tetrahydropyrimidiny (pyrantel a oxantel), salicylanilidy (niklosamid), izotiokyanáty (nitroskanat) a pyrazinové deriváty (praziquantel, epsiprantel). Poněkud obsoletním léčivem je již v současnosti arekolin (IPL).

### 1.2.1 Benzimidazoly

Skupina benzimidazolových anthelmintik je nejrozsáhlejší skupinou anthelmintik odvozenou od jediné chemické struktury. Část benzimidazolů patří k anthelmintikům s vůbec nejširším spektrem účinku. Benzimidazoly jsou obecně léčiva s antinematodní (včetně terapie trichuriózy), z části s antitrepatodní i anticestodní (výjimečně antimykotickou) aktivitou. Nedávné studie potvrdily též možnost využití benzimidazolových léčiv při terapii giardiózy (protozoóza).

Mechanismus účinku je založen na inhibici energetického metabolismu parazitujících červů. Inhibují syntézu tubulinu (strukturálního proteinu mikrotubulů), narušují tak transport a metabolismus glukózy, důsledkem je energetické vyčerpání a ztráta pohyblivosti parazitů a jejich pozvolné odumření. Většina léčiv skupiny působí proti dospělým i vývojovým stádiím helmintů, některá i ovocidně.

Anthelmintická aktivita je závislá na délce přetrvávání terapeutických koncentrací léčiva v tělních tekutinách a tkáních. U zvířat s jednodokorovým žaludkem (např. pes, kočka, prase) je většinou třeba opakovaného podání léčiva, u zvířat s žaludkem vícekomorovým či dalších býložravců (skot, ovce, kůň aj.) lze benzimidazoly podávat i jednorázově. Nevýhoda nutnosti opakované aplikace benzimidazolů může být u psů eliminována lékovou formou ochucených tablet (flubendazol), které jsou podávány tzv. z ruky a zvířaty přijímány většinou spontánně. Všechny benzimidazoly jsou nerozpustné, nebo slabě rozpustné ve vodě. Vyššího absorpčního efektu lze dosáhnout společnou aplikací léčiva s potravou. Kromě vlastních benzimidazolových léčiv jsou využívána i tzv. proléčiva (febantel). Anthelmintický účinek vykazují teprve jejich metabolity. K odstranění

parazitů z GIT nemusí docházet ani během několika dnů po ukončení terapie. To je výhodné zejména při masivní infekci parazity a nebezpečí obturace trávicího traktu shlukem paralyzovaných parazitů.

K léčivům celé skupiny benzimidazolů může vzniknout i anthelmintická rezistence. Parazité rezistentní na benzimidazoly jsou rezistentní i vůči probenzimidazolům. Možný teratogenní účinek léčiv této skupiny je stále ještě diskutován. Z důvodů nejednoznačnosti názorů je vhodné vyhnout se podávání benzimidazolů v březosti (zejména v prvním trimestru).

Ze skupiny vlastních benzimidazolů je pro psy a kočky u nás používán **fenbendazol**, **flubendazol**, a **oxibendazol**. U psů se pak uplatňuje i probenzimidazol **febantel** (proléčivo fenbendazolu). Časté jsou kombinace těchto léčiv s ostatními anthelminticky působícími léčivy zejména anticestody.

### 1.2.2 Makrocyclické laktony

Jsou léčiva biosyntetického původu, která můžeme rozdělit do dvou skupin na avermektiny a milbemyciny.

**Avermektiny** jsou fermentačním produktem půdní aktinomycety *Streptomyces avermitilis*. Vyznačují se jedinečným spektrem účinnosti umožňujícím léčbu onemocnění endoparazitárních (nematodózy) i ektoparazitárních (infekce členovci). Kromě toho se avermektiny vyznačují tendencí k reziduálnímu účinku, což umožňuje nejenom eliminovat stávající parazitární infekci, ale poskytnout po určitou dobu i ochranu proti opakované infekci. Zástupcem této skupiny využívaným při antiparazitární terapii u psů a koček je monokompozitně podávaný **selamektin**.

Selamektin je originální endektocid s unikátní kombinací vysoké účinnosti a bezpečnosti pro psy a kočky při spot-on aplikaci. Je lépe snášen především u kolií, které jsou známým plemenem vyznačujícím se idiosynkratickou senzitivitou k makrocyclickým laktonům (je snášen v dávkách 5x vyšších, než jsou dávky doporučené).

Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění funkce chloridových kanálů ve stabilizaci neuronů (hyperpolarizaci). To vede k narušení přenosu vzruchů v nervových vláknech, v důsledku toho dochází k inhibici elektrického potenciálu v nervových buňkách hlístic a ve svalových buňkách členovců. Účinnost byla rovněž prokázána proti některým vývojovým stádiím parazitů (vajíčka, larvy blech a larvy vlasovců). U savců jsou chloridové kanály v CNS pro velké molekuly avermektinů hůře přístupné,